

PERS - EN MAILBERICHTEN 06.08

1. Koeling varkensstallen/ voorkomen hittestress

Hittestress verstoort de groei van uw vleesvarkens en beïnvloedt het afleverpatroon. Een verstoring van regelmaat heeft meestal een negatief effect op de prijsvorming van uw geleverde dieren. Ook in de dekstal zijn er meer problemen met als gevolg een lager aantal te verkopen biggen in het eerste kwartaal van volgend jaar. Wat kunnen we doen aan hittestress?

- Plant langs de luchtinlaat groenblijvende struiken.
- Of maak langs de luchtinlaat een tunnel met stalen gaas en laat daar klimop tegen groeien (helix).
- Zet de luchtinlaat open en voorzie deze van windbreekgaas die 3 x groter is dan de luchtinlaat zelf en houdt deze windbreekgaas zuiver.
- Maak watersproeiers voor de luchtinlaat. Alléén te gebruiken bij een lage luchtvochtigheid.
- Zet sproeiers op het dak voor afkoeling van de dakplaten.
- Zorg dat er geen sproeiwater in de mestput komt.
- Haal de lucht binnen aan de koele kant van de stal.
- Bekijk uw dakisolatie van de stal nog eens goed en verduister uw lichtdoorlatende-golfplaten.
- Bestrijdt ratten en muizen.
- Zet rond juni/ juli meer dekrijpe opfokgelten in.
- Zorg dat de varkens niet dicht op elkaar liggen. Dit zou wel eens de belangrijkste en de meest onderschatte reden kunnen zijn. De meeste stallen, vooral op gesloten bedrijven zijn niet berekend op de huidige productieresultaten en liggen de dieren er te dicht op elkaar. Bij een verhit lichaam zien we een betere doorbloeding van de huid, maar zien we dat de belangrijke organen (darmen en lever) minder bloed krijgen en daardoor kwetsbaar worden. De groeidip die we daardoor zien, komt in mindere mate voor bij de gespecialiseerde vleesvarkenshouder. Verkoop dus enkele biggen als het te vol ligt. De naweeën van het "te vol liggen" komen door het feit dat er een hoge infectiedruk wordt opgebouwd. Een varken met (hitte)stress bouwt minder goed weerstand op en wordt makkelijk slachtoffer van ziektekiemen.

2. Verharingsvoeder code 754

Het lijkt erop dat zeugen zich niets aantrekken van de door ons geplande verharingsperiode.

Let wel op, in de vrije natuur zijn dieren tijdens het verharen minder actief, traag en lui.

Wetenschappers wijten dit aan een tekort aan vitaminen en spore-elementen wegens de opbouw van een nieuw haarkleed. Ziet u losse haren liggen, bestel dan **code 754**. Dit voeder bevat extra vitaminen en mineralen om de verharing bij de zeugen sneller te laten verlopen.

3. Meer slepende melkziekte bij rundvee in zomer

Slepende melkziekte komt het meest voor in de zomer. Uit onderzoek is gebleken dat met name bij weidegang het energieaanbod nog wel eens te krap kan zijn. Ook wordt, een door hittestress afnemende voeropname, als oorzaak genoemd.

4. Droogstandsmix code 1510

De droogstandsmix is speciaal ontwikkeld om uw koeien klaar te stomen voor de nieuwe lactatie. Deze mix is bedoeld om de penspapillen te laten groeien, zodat de pens beter is voorbereid om grote hoeveelheden voer te verwerken. Daardoor starten de koeien beter op en is er minder kans op slepende melkziekte.

Vanaf 10 dagen voor het afkalven dient ± 2 kg/koe/dag verstrekt te worden.

Daarnaast adviseren we (om de mineralenvoorziening veilig te stellen) **Rupromin Droogstand** (± 100 gr/dag) of de luxere **Rupromin Droogstand Plus ES** (± 150 gr/dag) voor bijsturing van de Kation-Anion Balans. Deze zijn ook in een likemmer te verkrijgen.