

PERS- & MAIL BERICHTEN

1. ZOMER: KUNSTMELK BIJVOEDEREN IN DE KRAAMSTAL

Het bijvoederen van kunstmelk tijdens de zoogperiode kan de speengewichten doen stijgen. Dit is vooral zo in de zomer, wanneer de voederopname van de zeug en de daarbij horende melkproductie lager ligt door de hoge temperaturen. Daardoor komen de speengewichten onder druk te staan. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bijgevoederde biggen 16% zwaarder wogen bij spenen dan de biggen uit de controlegroep. De biggen welke in de zomerperiode deelnamen aan de proef hadden een voerconversie van 1,17. Zij wogen 1,18 kg zwaarder bij spenen na de opname van 1,39 kg kunstmelk per big.

Theeuwes – Moonen heeft verschillende melkvervangers in het assortiment. Porcimilk A (code 6227) is een aangezuurd melkpoeder welke geleverd wordt in een handige afsluitbare emmer van 10 kg. Porcimilk A wordt meestal gedurende een 10-tal dagen bijgevoerd in de kraamstal waarna vrij snel overgeschakeld dient te worden naar vast voeder.

Sinds kort hebben we ook Rescue Milk (code 6281) in het assortiment. Rescue Milk is een speciaal ontwikkelde kunstmelk (bevat bloedplasma) voor biggen die moederloos grootgebracht worden. Dit kan gedurende de ganse zoogperiode bijgevoerd worden. Rescue Milk wordt geleverd in zakken van 25 kg.

2. DETTOL IN DE KRAAMSTAL

In het verleden hebben we wel eens in deze Pers- & Mailberichten geadviseerd de uiers van hoogdrachtige zeugen in het kraamhok handmatig te wassen met Dettol om de uier te ontsmetten. Enkele handige varianten hierop zijn het vernevelen van Dettol met de rugsproeier of door middel van de schuimplans van de hogedrukreiniger na het wassen van de zeugen.

3. GEBRUIK MEMOALARM OP GSM

Heb je in de stal soms een taak die je wel eens kan vergeten? Een handig hulpmiddel voor de mensen die hun GSM mee de stal in nemen is het instellen van een memoalarm in hun toestel. Op die manier wordt je automatisch aan je taak herinnert. Bijvoorbeeld: het gesplitst zogen van een toom pasgeboren biggen. De kans bestaat dat je de afgezonderde biggen vergeet terug te zetten bij de zeug. Stel op het moment van gesplitst zogen het alarm in op een uurtje later, zodat de biggen niet vergeten worden.

4. RUNDVEE: BROEIGEVOELIGHEID ALS KENGETAL IN KUILKENNER

Kuilkenner van BLGG wordt dit seizoen uitgebreid met een nieuw kengetal: broeigevoeligheid. De broeigevoeligheid geeft aan of de kuil een grote kans heeft op broei na het openen van de kuil. Met dit kengetal kunt u maatregelen nemen om de mogelijke kuilverliezen te verkleinen. Denk hierbij aan:

- de kuilafdekking verzwaren zodat er minder zuurstof de kuil binnendringt;
- de voersnelheid verhogen door wijzigingen in het rantsoen aan te brengen;
- de broeigevoelige kuil in de winter openen omdat de temperatuur in de kuil dan minder snel oploopt;
- een broeiremmer gebruiken op het moment van uitkuilen.

5. MESTVERWERKINGSPLICHT 2007 EN MESTVERWERKINGSCERTIFICATEN

Bent u nog op zoek naar mestverwerkingscertificaten om aan de mestverwerkingsplicht van 2007 te voldoen? Of kent u iemand die hiernaar op zoek is, neem contact op met Guy Moonen (0475/81.71.38). Hij kan u hierbij helpen.