PERS - EN MAILBERICHTEN JULI 2011

1. Beëindiging productie voer met antibiotica

De productie van met antibioticum gemedicineerde varkensvoeders is per 1 juli jl. beëindigd. Hiermee willen wij, als verantwoorde producent van mengvoeders, graag onze bijdrage leveren om tot vermindering en verbetering te komen van het antibioticumgebruik in de Nederlandse dierhouderij. Als lid van NEVEDI zijn wij als convenantpartner nauw betrokken bij de afspraken tussen overheid en sector om tot reductie van antibioticumgebruik te komen, met 20% in 2011 en 50% in 2013. De beëindiging van de productie van gemedicineerde voeders past in deze convenantafspraken tussen onder andere LTO, NVV, KNMvD en COV en is in ons GMP+ vastgelegd. Graag blijven we met u samenwerken aan gezond, verantwoord en heerlijk Nederlands varkensvlees. Nu en in de toekomst!

2. Variatie melksamenstelling bij melkkoeien

De melksamenstelling varieert behoorlijk sterk over het seizoen. In Europa worden de koeien meestal geweid en dit is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het verloop in melksamenstelling gedurende het jaar.

Er zijn echter meer factoren die hierop invloed hebben:
Daglengte: Het is bekend dat de lichtintensiteit de voeropname stimuleert. Als gevolg daarvan stijgt de melkproductie. Het gehalte aan vaste stoffen (vet, eiwit) in de melk daalt dan – deels door verdunning.
Weiderantsoenen: Op mals voorjaarsgras is het melkvetgehalte wat lager.
Vezels: Rantsoenen met zeer fijn gehakseld ruwvoer kunnen leiden tot melkvetdepressie.
Ruwvoer : krachtvoer verhouding: Rantsoenen met een lage ruwvoer : krachtvoer-ratio verlagen het vetgehalte in de melk.
Zetmeelniveaus: Op hoog-zetmeel-rantsoenen is het melkvetgehalte wat lager, mede afhankelijk van de afbreekbaarheid van het zetmeel.
Vet: Melkveerantsoenen bevatten doorgaans minder dan 6% vet om het risico op melkvetdepressie te reduceren.
Hittestress: Uit recent onderzoek blijkt, dat hittestress de vet- en eiwitgehalten in de melk verlaagt, doordat de insulinespiegel en de insulinegevoeligheid toenemen. Dit leidt tot minder lipolyse (vetoxidatie), meer opslag van vet en minder mobilisatie van lichaamsvet. Deze veranderingen zorgen voor een daling van het vetgehalte in de melk.
Om te snelle veranderingen in melksamenstelling in het weideseizoen te voorkomen kan een pensbestendig vet, zoals HyproFat, ingezet worden om het melkvet gehalte op peil te houden.

3. Verharingsperiode zeugen: voercode [754]

Het lijkt erop dat zeugen zich niets aantrekken van de door ons geplande verharingsperiode.
Let wel op, in de vrije natuur zijn dieren tijdens het verharen minder actief, traag en lui.
Wetenschappers wijten dit aan een tekort aan vitaminen en sporenelementen wegens de opbouw van een nieuw haarkleed. Ziet u losse haren liggen, bestel dan een aantal bulken code [754]. Dit voeder bevat extra vitaminen, mineralen en o.a. lijnzaad om de verharing bij de zeugen sneller te laten verlopen. Voor diegene die ad-lib, welzijnsvoer of concentraten/aanvullende voeders voeren en die iets extra's willen doen, raadpleeg uw adviseur over wat u het beste kunt doen.

4. Verlagen van fosfaatproductie

In december 2010 hebben Nevedi en LTO Nederland een akkoord bereikt voor het sturen op het verlagen van de fosfaatproductie via diervoeders oftewel het 'voerspoor'. Inmiddels is er de P-toets ontwikkeld. Daarmee kan de fosfaatbenutting op Uw bedrijf getoetst worden aan de verschillende normen per diercategorie die straks gaan gelden. Pas na goedkeuring door de SER en het ministerie van EL&I kan het productschap officieel van start gaan met de verordening.
Wordt vervolgd…

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com