

PERS- EN MAILBERICHTEN 09.07

1. Blauwtongperikelen

Bij de blauwtong besmetting wordt het virus door knutten rechtstreeks in de bloedbaan gebracht. Door de beschadigingen aan de kleine bloedvaten treedt vocht uit met ophoping daarvan op verschillende plaatsen: zwelling (oedeem) van lippen, mond, neus, oogleden, oren, longen, spenen en poten. De vochtuittrekking in de poten kan leiden tot meer of minder ernstige kreupelheid. Ook treden bloedingen, neusuitvloeiing en speekselen op. Volgend op een besmetting kunnen de dieren ook meerdere dagen koorts houden (tot 41°C).

Meer info vindt u op de website van de gezondheidsdienst www.gddeventer.com en op de site van het Ministerie van Landbouw, Natuur en volksgezondheid www.minlnv.nl.

Hieronder enkele tips om de besmetting te beïnvloeden:

- Behandelingen moeten gericht zijn op pijnbestrijding en ontstekingremming. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.
- Voorzie een smakelijk rantsoen dat voldoende energie bevat.
- Voeder voldoende vitaminen en mineralen.

2. Plan uw mestafzet

Reken nu al de mestvoorraad uit (dus vóór 31 december 2007), zodat er in beeld komt hoeveel mest er nog afgevoerd of opgeslagen dient te worden.

3. De R zit weer in de maand

Silo's reinigen, ongediertebestrijding, voergift dragende zeugen met 5 à 10% verhogen, afhankelijk van de conditie van de zeug.

Daglengte maken van 16 uur licht van min. 250 Lux (laat uw voorlichter nameten) d.m.v. extra TL-lampen te hangen, te weten 30 cm boven de koppen van de zeugen. Het 16 uur licht en 8 uur donker instellen d.m.v. een tijd klok (niet handmatig).

4. ZEUGEN : Vlot voederen na het dekken

In de eerste maand van de dracht vindt de innesteling plaats van de bevruchte eicellen. Het cruciale moment bij dit proces verloopt tussen dag 14 en 21.

Naast voldoende rust voor de zeug, is een goede voedergift van belang. Dit is immers de fase van conditieherstel van de zeug na de kraamperiode.

Binnen 30 dagen na dekken, zou de conditie terug op het gewenste niveau moeten zijn. Om dit te bereiken raden we het volgende aan:

- Tijdens eerste 2 dagen na dekken, maximaal 2,5 kg voer/dag (risico van embryonale sterfte).
- Vanaf dag 3 de voergift verhogen tot max 3.0/3.5 kg voer/dag tot dag 30 en daarna verlagen tot 2,5 kg voer/dag. Voorkom dat de zeugen te vet de laatste maand van de dracht ingaan zodat u in deze maand minimaal 3,0 kg kunt voeren i.v.m. de explosieve groei van de vruchten in deze periode.
- Te magere zeugen uiteraard iets meer geven en te vette zeugen iets minder!

5. Geert van der Bruggen

Per 1 september is Geert van der Bruggen begonnen als rundveespecialist. Geert is 27 jaar en is opgegroeid op het melkveebedrijf van zijn ouders. Na zijn HAS-opleiding heeft hij enkele jaren ervaring opgedaan bij Neutkens zaden en aardappelen. Samen met Richard Bastiaansen zal hij alle vraagstukken omtrent veevoeding en de rundveehouderij aanpakken.

6. Voerbestelling

Achter de schermen werken onze produktiemedewerkers met veel kennis, enthousiasme en inzet om voor U voeders van zeer goede kwaliteit te maken. Dat een goede planning daarbij zeer belangrijk is, is natuurlijk vanzelfsprekend. En wat wil nu het geval; U kunt hen daarbij het beste helpen. Hoe "vroeger" de bestelling binnenkomt, des te beter kunnen zij plannen en loopt het allemaal vlotter. Bij voorbaat dank namens de productiemedewerkers.

Laat uw bestelling op tijd horen. Graag 24 uur van te voren !!